

Package of Practice

Particular	English	Hindi
Crop	Cauliflower	Cauliflower
Season/Region	Summer, Rabi, Kharif as per product segment. Summer :Tropical - March to May Kharif :Tropical / Sub-tropical - Mar to June & July to Aug	उत्पाद खंड के अनुसार ग्रीष्म, रबी, खरीफ। ग्रीष्म: उष्णकटिबंधीय - मार्च से मई खरीफ: उष्णकटिबंधीय / उपोष्णकटिबंधीय - मार्च से जून और जुलाई से अगस्त
Land preparation	Select medium to sandy soils for cauliflower. It should have excellent drainage history. Soils with good nutrients helps cauliflower cultivation. Land should be levelled and low weed flora history.	फूलगोभी के लिए मध्यम से रेतीली मिट्टी चुने। इसमें जल निकासी का अच्छा इतिहास होना चाहिए। अच्छे पोषक तत्वों वाली मिट्टी फूलगोभी की खेती के लिए अनुकूल होती है। भूमि समतल होनी चाहिए और खरपतवारी का इतिहास कम होना चाहिए।
Seed rate & Method	Seed Rate: Seed Rate: 100-120 g per acre. Sowing: Sow the seeds in nursery, after 21 days, seedlings will get ready for transplant.	बीज दर: 100-120 ग्राम प्रति एकड़। बुवाई: बीजों को नर्सरी में बोएँ, 21 दिनों के बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाएंगे।
Spacing	Spacing: Tropical - 60 x 30 cm, Su b-tropical - 60 x 45 cm, Temperate - 60 x 45 cm.	अंतराल: उष्णकटिबंधीय - 60 x 30 सेमी, उपोष्णकटिबंधीय - 60 x 45 सेमी, समशीतोष्ण - 60 x 45 सेमी।
Harvest	Curd maturity depends on product segment. Tropical cauliflower matures at 55- 65 days after planting, sub-tropical and temperate matures at 60-75 and 75-85 days respectively.	दही की परिपक्वता उत्पाद खंड पर निर्भर करती है। उष्णकटिबंधीय फूलगोभी रोपण के 55-65 दिनों के बाद पक जाती है, जबकि उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण फूलगोभी क्रमशः 60-75 और 75-85 दिनों में पक जाती है।
Expected Average Yield	Average yield: 12 -13 MT Sub-tropical -14-15 MT, Temperate - 16-18 MT per acre.	औसत उपज: 12-13 मीट्रिक टन उपोष्णकटिबंधीय -14-15 मीट्रिक टन, समशीतोष्ण - 16-18 मीट्रिक टन प्रति एकड़।
Nutrient Management	It needs balanced and adequate fertilizer supply. Put FYM - 5 ml + 50 kg SSP + 50 kg mop as basal dose. - Apply 50 kg urea just before ridge making. - 10 days after transplant apply 100 kg urea. - 20 days after transplant apply 50 kg DAP + 50 kg 10:26:26 + 800gm Boron. 30 days after transplant apply 75 kg 10:26:26 + 25 kg urea.	इसे संतुलित और पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति की आवश्यकता होती है। गोबर की खाद डालें - 5 मिली + 50 कि.ग्रा. सुपरफॉस्फेट + 50 कि.ग्रा. मॉप मूल मात्रा के रूप में। - मेड़ बनाने से ठीक पहले 50 कि.ग्रा. यूरिया डालें। - रोपाई के 10 दिन बाद 100 कि.ग्रा. यूरिया डालें। - रोपाई के 20 दिन बाद 50 कि.ग्रा. डीएपी + 50 कि.ग्रा. 10:26:26 + 800 ग्राम बोरॉन डालें। रोपाई के 30 दिन बाद 75 कि.ग्रा. 10:26:26 + 25 कि.ग्रा. यूरिया डालें।
Pest & Disease management	In summer use recommended insecticides to control DBM and leaf eating caterpillars.	गर्मियों में डीबीएम और पत्ती खाने वाले केटरपिलर को नियंत्रित करने के लिए अनुशंसित कीटनाशकों का उपयोग करें।
Weed Control - Chemicals with doses and timing	Timely weed removal is very important, need based hand weeding can be done to ensure healthy crop.	समय पर खरपतवार निकालना बहुत महत्वपूर्ण है, स्वस्थ फसल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार हाथ से निराई की जा सकती है।
Irrigation Schedule	Cauliflower need optimum irrigation at all stages. Light soils and summer season need more frequent irrigation. It is advised to have running (light) irrigation in winter and rainy season.	फूलगोभी को सभी अवस्थाओं में पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। हल्की मिट्टी और गर्मी के मौसम में अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। सर्दियों और बरसात के मौसम में लगातार (हल्की) सिंचाई करने की सलाह दी जाती है।